

Einige neue paläarktische und orientalische Tenthrediniden.

Von Fr. W. Konow, p., Teschendorf.

(Fortsetzung aus H. 4 p. 256.)

4. Gen. *Periclista* Knw.

1. *P. Andrei* n. sp. ♀. *Pallide rufa, albido- et nigro-varia; palpis, pronoto, tegulis, coxis, trochanteribus, abdominis ventre et lateribus albidis; capitis et thoracis suturis, antennis — 2 articulis basalibus exceptis —, pronoti fascia angusta media, mesonoti 2 vittis et 2 maculis antescutellaribus, foveis alaribus, scutelli apice, metanoto, pectore, maculis parvis coxarum, trochanterum, ventris nigris; abdominis dorso basin versus nigro, apicem versus luteo, magis minusve obscurato; alis hyalinis, costa et stigmatate pallide testaceis, ceteris venis fuscis.*

Ovata, subnitida; capite et thorace cano-pubescentibus; hoc pone oculos non angustato; labro triangulari; clypeo subdeplanato, parce punctato, apice subemarginato; antennis filiformibus, caput una cum thorace longitudine aequantibus; fovea supraantennali lata sed non profunda; area frontali parva, late subtriangulari; fronte et vertice subtiliter punctulatis; vertice subelato, longitudine sua duplo latiore. Ceteroquin *P. melanocephalae* F. simillima. — Long. 6 mm.

Patria: Hispania (Pozuelo de Calatrava).

Herrn *Ernest André* verdanke ich diese schöne Spezies und benenne sie demselben zu Ehren. Der hell gefärbte Kopf zeichnet sie vor allen andern europäischen *Blennocampiden* aus.

5. Gen. *Monophadnus* Htg.

1. *M. rivalis* n. sp. ♀: *Atrocoeruleus, viridi-micans; alis superioribus nigro-fuscis, summa basi hyalinis, inferioribus hyalinis, summo apice subinfuscatis; venis et stigmatate nigris.*

Elongato-ovatus, nitidus; capite et thorace fusco-pilosulis; capite pone oculos non angustato; clypeo non dense ruguloso-punctato, apice rotundato; antennis longius nigro-pilosis, caput una cum thorace longitudine aequantibus, abdomine brevioribus; articulo tertio 4^o sesqui longiore; articulis 4.—6. inter se aequilongis; facie supra-antennali subrugulosa; fovea supraantennali magna sed non profunda; area frontali parva, subimpressa; vertice longitudine sua sesqui latiore; alarum superiorum cellula secunda cubitali brevi, 1^a parum longiore; tertia longissima, 2 anterioribus unitis duplo longiore, apice fere recte truncata, nervum radialem curvatum pone medium excipiente; nervo areali cellulam discoideam ante medium attingente; alarum inferiorum nervo areali longe pone aream humeralem sito; unguiculis dente basali armatis; vagina angusta, a latere invisae apice late rotundata. — Long. 11 mm.

Patria: Java (Soekaboem).

6. Gen. *Athlophorus* Burm.

1. *A. orbitalis* n. sp. ♀. *Niger; oculorum orbita interiore tenui, superne abbreviata, pronoti margine tenui posteriore, medio late interrupto, cenchris, tiliarum macula basali exteriori albis; abdominis segmentis 2.—4. pallide flavis, superne iuxta lineam medialem utrobique macula nigra ornatis; segmenti dorsalis octavi margine posteriore, noni medio, ultimo toto albido-luteis; alis hyalinis, venis et stigmatibus nigris; litura substigmatica aream radialem — apice excepto — explente et infra superante obscure fusca.*

Gracilis; facie, temporibus, mesopleuris albido-, sincipite et mesonoto fusco-pubescentibus; capite pone oculos angustato; clypeo et facie densissime subruguloso-punctulatis, opacis; sincipite fere laevi, nitente; clypeo apice late emarginato; antennis caput una cum thorace longitudine superantibus; fovea supraantennali maiore sed non profunda; vertice latitudine sua fere longiore; pronoto subtiliter et dense, mesopleuris crasse subruguloso-punctatis; mesonoto subtilissime punctulato, subnitente; scutello crassius ruguloso, opaco; abdominis dorso subtiliter et densissime ruguloso-punctato; fere opaco: segmentis dorsalibus 1.—3. fere laevibus, primo in lateribus punctato; alarum superiorum cellula secunda cubitali primam longitudine vix superante, nervum radialem paullulo pone

medium recipiente; vagina longius exserta, angusta, metatarsi crassitudinem non superante. — Long. 9 mm.

Patria: Sumatra (in Singalang monte).

Dem *A. gracilis* Knw. nahe stehend, aber an der weissen Orbita und der ziemlich lang weissgefleckten Tibienbasis leicht kenntlich; bei *gracilis* ist Oberkopf und Mesonotum deutlich punktuliert, und im Vorderflügel empfängt die 2. Cubitalzelle den Radialnerven vor der Mitte.

7. Gen. *Tenthredo* L.

1. *T. umbonigera* n. sp. ♀. *Flavescenti-albida, superne nigro-variegata; mandibularum apice, antennis, macula ocellari, vertice, pronoti medio, mesonoto — lobi medii lateribus anterioribus exceptis —, mesopleurorum parte superiore, pectoris utrinque macula parva posteriore, metapleurorum macula, segmentorum abdominis dorsalium fasciis basalibus, medium versus dilatatis, vagina, pedibus posticis — coxis trochanteribusque exceptis —, femorum anteriorum vitta posteriore nigris; alis subfuscescenti-hyalinis; area radiali apice pallide infuscata; nodulis albidis; costae summa basi et stigmatate albido-testaceis.*

Elongata, nitida; ore longius, facie inferiore, mesopleuris cano-, sincipite et mesonoto nigro-pilosulis; capite pone oculos subangustato; palpis albis; labro et clypeo crassius punctatis, illo apice minus profunde emarginato, angulis rotundatis; antennis gracilibus, medio subincrassatis, abdomine multo longioribus; articulis tertio et quarto inter se fere aequilongis, 5^o longioribus, ceteris longitudine decrescentibus; fronte intraantennali minus profunde sulcata, supraantennali subruguloso-punctata, sub ocello inferiore subimpressa; genis et sincipite non dense punctulatis; ocellis sub linea oculos tangente positis; vertice latitudine sua fere longiore; mesonoto sparsim punctulato; scutello altius elato, acute pyramidato, superne sparsim, in lateribus densius punctato; mesopleuris ad pectus versus subintumescentibus, superne sparsius, infra densius punctatis, nitentibus; abdomine basi coarctato, medio dilatato; dorso subtiliter et densissime punctulato, subnitente, brevissime nigro-pubescente; alarum superiorum nervo radiali infra medium fortiter curvato, cum radio angulos rectos efficiente; cellula tertia cubitali 2 anteriores unitas longitudine aequante; nervo discoidali 1^o mediali brevioribus; nervo areali quintam fere partem cellulae discoidalis decedente; vagina exserta, angusta, apice nigro-pilosa. — Long. 13 mm.

Patria: Sumatra (in Singalang monte).